

Распознавание цифры восемь коллективами автоматов

Б. Стаматович

Изучается проблема существования автомата (пешки), распознающего некоторый класс шахматных лабиринтов (π -лабиринтов). Этот класс в геометрическом смысле представляет цифру восемь. В [4] доказано, что для этого класса не существует распознающего автомата. В [5] показано, что для односвязных цифр существует распознающий автомат. В [6] показано, что для двусвязных цифр существует распознающий коллектив типа $(1, 1)$. В предлагаемой работе приводится доказательство существования распознающего коллектива типа $(1, 1)$ для цифры восемь.

1. Основные понятия и результаты

Основные обозначения и понятия, такие как конечный автомат, лабиринт, пешка и т.п. взяты из [1, 2, 3]. Обозначим через $e = (1, 0)$, $n = (0, 1)$, $w = (-1, 0)$, $s = (0, -1)$ единичные векторы евклидова векторного пространства \mathbb{R}^2 и через $\mathbf{0} = (0, 0)$ – нулевой вектор.

Пусть $a = (a_1, a_2)$ и $b = (b_1, b_2)$ – произвольные элементы множества \mathbb{Z}^2 . Говорим, что a и b (слабо) соседние, если $(\|a - b\| < 2)$ $\|a - b\| = 1$, где $\|a - b\| = [(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2]^{1/2}$. Последовательность $a = p_0, p_1, \dots, p_m = b$ в \mathbb{Z}^2 называется (слабой) цепью, связывающей точку a и точку b , если точки p_{i-1} и p_i (слабо) соседние для любого i , $1 \leq i \leq m$. Множество V , $V \subseteq \mathbb{Z}^2$ называется (слабо) связным, если для любых $a, b \in V$ существует (слабая) цепь в V , связывающая их. Компонентой (слабой) связности множества V называется любое максимальное (слабо) связанное подмножество множества V .

π -лабиринтом называется любое отображение $c: \mathbb{Z}^2 \rightarrow E^2$, ($E^2 = \{0, 1\}$) такое, что $P_c = c^{-1}(\{1\})$ является связным множеством. Если p_0 – произвольная точка в P_c , тогда пара (c, p_0) называется π -лабиринтом с началом p_0 . π -лабиринт называется конечным (бесконечным), если множество P_c является конечным (бесконечным). В будущем под π -лабиринтом будем понимать конечный π -лабиринт. Дырой π -лабиринта c называется произвольная компонента слабой связности множества $\mathbb{Z}^2 \setminus P_c$.

Пусть c – произвольный π -лабиринт. Рассмотрим граф $G_c = (P_c, X_c)$, у которого P_c – множество вершин, X_c – множество дуг, и $\langle p_1, p_2 \rangle \in X_c$ тогда и только тогда, когда p_1 и p_2 – соседние точки ($p_1, p_2 \in P_c$).

Для произвольного множества A через $P_0(A)$ обозначим множество всех его непустых подмножеств.

Обозначим $D = \{e, n, w, s\}$.

Пусть даны инициальный автомат $\mathbf{A}_i = (A_i, Q_i, B_i, \varphi_i, \psi_i, q_{i0})$ и упорядоченный набор $\vec{V}_i = (p_1^i, \dots, p_{n_i}^i)$ ненулевых векторов из \mathbb{Z}^2 для любого i , $1 \leq i \leq n$. Предположим, что \mathbf{A}_i – такой автомат, что $B_i \subseteq V_i^i = \{0, p_1^i, \dots, p_{n_i}^i\}$, и A_i – множество всех таких

$$a^i = (a_1^i, \dots, a_{n_i}^i) \in \left[\{0, 1\} \cup P_0 \left[\bigcup_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (\{j\} \times Q_j) \right] \right]^{n_i+1},$$

что если $a_{k_l}^i \notin \{0, 1\}$, $l = 1, 2, 3$, то $pr_1(a_{k_1}^i) \cap pr_1(a_{k_2}^i) = \emptyset$ и $|a_{k_3}^i \cap \{j\} \times Q_j| \leq 1$ для любого j , $1 \leq j \leq n$; $0 \leq k_1, k_2, k_3 \leq n_i$, $k_1 \neq k_2$; $1 \leq i \leq n$. Допустим далее, что для произвольного $q \in Q_i$, если $a_0^i \neq 0$ и $\psi(q, a^i) = p_k^i$, $0 \leq k \leq n_i$, то $a_k^i \neq 0$; $p_0^i = 0$; $1 \leq i \leq n$. Система $\mathcal{A} = (\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n)$, которая обладает указанными выше свойствами, называется *системой взаимодействующих (коллективном) регулярных пешек*, а набор \vec{V}_i , $1 \leq i \leq n$ – *полем зрения* пешки \mathbf{A}_i . Далее, если для пешки \mathbf{A}_i набор $\vec{V}_i = (p_1^i, \dots, p_{n_i}^i)$ является полем зрения и если $p_j^i = (\alpha_j^1, \alpha_j^2)$ ($p_0^i = 0$), $1 \leq j \leq n_i$, то под $a_{\alpha_j^1, \alpha_j^2}$ будем понимать a_j ; $a = (a_0, a_1, \dots, a_{n_i}) \in A_i$.

Для произвольной пешки \mathbf{A} через $A_{\mathbf{A}}, B_{\mathbf{A}}, Q_{\mathbf{A}}$ будем обозначать, соответственно, ее множества входов, выходов и состояний, а через

$\varphi_{\mathbf{A}}$ и $\psi_{\mathbf{A}}$, соответственно, – ее функции выхода и перехода.

Пусть $\mathcal{A} = (\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n)$ – произвольная система взаимодействующих пешек, $\vec{V}_i = (p_1^i, \dots, p_{n_i}^i)$ – поле зрения пешки \mathbf{A}_i , $1 \leq i \leq n$, и c – произвольный π -лабиринт. Предположим, что пешка \mathbf{A}_i в состоянии q_i находится на поле z_i ; $q_i \in Q_{\mathbf{A}_i}$; $z_i \in P_c$; $1 \leq i \leq n$. Определим вход $a_{\mathbf{A}_i}(z_i)$ пешки \mathbf{A}_i , $1 \leq i \leq n$, следующим образом:

$$[a_{\mathbf{A}_i}(z_i)]_{\alpha_1^i, \alpha_2^i} = \begin{cases} 0, & z_i + (\alpha_1^i, \alpha_2^i) \notin P_c, \\ 1, & z_i + (\alpha_1^i, \alpha_2^i) \in P_c \wedge \forall j \neq i, 1 \leq j \leq n, \\ & z_j - z_i \neq (\alpha_1^i, \alpha_2^i), \\ \{ (j, q_j) \mid z_j - z_i = (\alpha_1^i, \alpha_2^i), j \neq i, 1 \leq j \leq n \} & \\ & \text{в остальных случаях;} \end{cases}$$

$(\alpha_1^i, \alpha_2^i) \in V_i'$. Ясно, что $a_{\mathbf{A}_i}(z_i)$ зависит от \mathcal{A} , \vec{V}_i ($1 \leq i \leq n$) и от размещения пешек этой системы, то есть от $\{z_i\}_{i=1}^n$. Поскольку всегда будет ясно из контекста, о каком коллективе идет речь и где находятся пешки этой системы, будем пользоваться этим обозначением без специальной оговорки.

Пусть (c, z_0) – произвольный π -лабиринт с началом в z_0 , $z_0 \in P_c$, и $\mathcal{A} = (\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n)$ – некоторая система взаимодействующих регулярных пешек. *Поведением* коллектива \mathcal{A} в π -лабиринте c называется последовательность $\pi(\mathcal{A}; c, z_0) : (\vec{z}_0, \vec{a}_0, \vec{b}_0, \vec{q}_0), \dots, (\vec{z}_t, \vec{a}_t, \vec{b}_t, \vec{q}_t), (\vec{z}_{t+1}, \vec{a}_{t+1}, \vec{b}_{t+1}, \vec{q}_{t+1}), \dots$, где $\vec{z}_t = (z_t^1, \dots, z_t^n)$, $\vec{a}_t = (\vec{a}_t^1, \dots, \vec{a}_t^n)$, $\vec{a}_t^i = (\vec{a}_{t0}^i, \dots, \vec{a}_{tin_i}^i) \in A_{\mathbf{A}_i}$ ($1 \leq i \leq n$), $\vec{b}_t = (b_t^1, \dots, b_t^n)$, $b_t^i \in B_{\mathbf{A}_i}$ ($1 \leq i \leq n$), $\vec{q}_t = (q_t^1, \dots, q_t^n)$, $q_t^i \in Q_{\mathbf{A}_i}$ ($1 \leq i \leq n$) такие, что $\vec{z}_0 = (z_0, \dots, z_0)$, $\vec{z}_{t+1} = \vec{z}_t + \vec{b}_t$, $b_t^i = \psi_i(q_t^i, a_t^i)$, $q_{t+1}^i = \varphi_i(q_t^i, a_t^i)$, а $a_{tk}^i = [a_{\mathbf{A}_i}(z_t^i)]_{\alpha_k^i, \beta_k^i}$, где $p_k^i = (\alpha_k^i, \beta_k^i) \in \vec{V}_i$, $\vec{V}_i = (p_1^i, \dots, p_{n_i}^i)$ – поле зрения пешки \mathbf{A}_i . Ясно, что $\vec{z}_t \in P_n^c$ для любого t , $t = 0, 1, \dots$

Далее везде предполагается, что $\vec{V}_i = \vec{V}_0$ и $B_i = D \cup \{0\}$ для любого i , $1 \leq i \leq n$, где $\vec{V}_0 = ((1, -1), (1, 0), (1, 1), (0, -1), (0, 1), (-1, -1), (-1, 0), (-1, 1))$.

Пусть $\text{Int}(\mathcal{A}; c, z_0) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \left(\bigcup_{j=1}^n z_i^j \right)$. Множество $\text{Fr}(\mathcal{A}; c, z_0) = P_c \setminus \text{Int}(\mathcal{A}; c, z_0)$ называется краем для коллектива \mathcal{A} в π -лабиринте (c, z_0) .

Если $\text{Fr}(\mathcal{A}; c, z_0) = \emptyset$, то говорим, что коллектив \mathcal{A} обходит π -лабиринт (c, z_0) .

Пусть выделены пешки $\mathbf{A}_{i_1}, \mathbf{A}_{i_2}, \dots, \mathbf{A}_{i_m}$, $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n$, в \mathcal{A} , $\mathbf{A}_{i_j} = (A_{i_j}, Q_{i_j}, B_{i_j}, \varphi_{i_j}, \psi_{i_j})$, $1 \leq j \leq m$, удовлетворяющие следующему условию. Предположим, что $Q_{i_j} = \{q_{i_j}\}$, и для любого $a = (a_0, a_1, \dots, a_8) \in A_{i_j}$, либо $\psi_{i_j}(q_{i_j}, a) = 0$, либо, если $\psi_{i_j}(q_{i_j}, a) = b \neq 0$, то существуют s , $s \neq i_k$ ($1 \leq k \leq m$) и q , $q \in Q_s$ такие, что $(s, q) \in a_0$ и $\psi_s(q, a') = b$, где $a' = ((a_0 \setminus \{(s, q)\}) \cup \{(i_j, q_{i_j})\}, a_1, \dots, a_8)$; $1 \leq j \leq m$. Тогда пешки $\mathbf{A}_{i_1}, \mathbf{A}_{i_2}, \dots, \mathbf{A}_{i_m}$ называются *камнями* в коллективе \mathcal{A} .

Коллектив \mathcal{A} с m отмеченными автоматами $\mathbf{A}_{i_1}, \mathbf{A}_{i_2}, \dots, \mathbf{A}_{i_m}$, которые являются камнями, называется *коллективом из $n - m$ автоматов с m камнями (коллектив типа $(n - m, m)$)*.

Кроме инициального состояния q_0 автомата $\mathbf{A}_{q_0} = (A, Q, B, \varphi, \psi, q_0)$ можно ввести множество *заключительных состояний* $Q_F \subseteq Q$. Пусть $Q_F = \{q_{F_0}, q_{F_1}\}$. Будем говорить, что автомат \mathbf{A}_{q_0} (коллектив $\mathbf{S} = (\mathbf{A}_{q_0}, \mathbf{K})$ типа $(1, 1)$) *распознает* лабиринт L_ν , если при его запуске в лабиринт L_ν происходит переход автомата \mathbf{A}_{q_0} в заключительное состояние q_{F_1} , а при его запуске в лабиринт $L_{\nu'} \neq L_\nu$ происходит переход в заключительное состояние q_{F_0} . Пусть \mathbf{C} – класс инициальных лабиринтов. Говорим, что автомат \mathbf{A}_{q_0} (коллектив $\mathbf{S} = (\mathbf{A}_{q_0}, \mathbf{K})$ типа $(1, 1)$) *распознает класс \mathbf{C}* , если при его запуске в любой лабиринт L_ν происходит переход автомата \mathbf{A}_{q_0} в заключительное состояние q_{F_1} только тогда, когда $L_\nu \in \mathbf{C}$, и для любого лабиринта $L_\nu \notin \mathbf{C}$ происходит переход в заключительное состояние q_{F_0} .

Если множество $K \in P$, тогда границей ∂K множества K будем называть множество $\{z \in K \mid \text{существует точка } z'' \text{ в } \mathbb{Z}^2 \setminus K \text{ такая, что } z \text{ и } z'' \text{ слабо соседние}\}$. Вокруг каждой точки $z = (z_1, z_2) \in \partial K$ рассмотрим квадрат kv_z с длиной стороны 1. Его стороны обозначим через $\alpha, \beta, \chi, \delta$:

$$\begin{aligned} \alpha &= \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid z_1 - 1/2 \leq x_1 \leq z_1 + 1/2, x_2 = z_2 + 1/2\}, \\ \beta &= \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid z_1 - 1/2 \leq x_1 \leq z_1 + 1/2, x_2 = z_2 - 1/2\}, \\ \chi &= \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = z_1 - 1/2, z_2 - 1/2 \leq x_2 \leq z_2 + 1/2\}, \\ \delta &= \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = z_1 + 1/2, z_2 - 1/2 \leq x_2 \leq z_2 + 1/2\}. \end{aligned}$$

Стороны $\alpha, \beta, \chi, \delta$ квадрата $kv_z, z \in \partial K$, имеют свойство «сторона находится между точками множества K и множества $\mathbb{Z}^2 \setminus K$ », если точки $(z_1, z_2 + 1), (z_1, z_2 - 1), (z_1 - 1, z_2), (z_1 + 1, z_2)$ не принадлежат множеству K , соответственно.

Пусть st_z множество сторон квадрата kv_z , которые имеют свойство «сторона находится между точками множества K и множества $\mathbb{Z}^2 \setminus K$ ». Фигура $F_K = \bigcup_{z \in \partial K} st_z$ представляет собой прямоугольный полигон.

Пусть $K \subset \mathbb{Z}^2$ конечное связное множество. Самая нижняя и самая правая точка (НП) множества K есть точка $z = (z_1, z_2) \in K$ такая, что для каждого $a = (a_1, a_2) \in K, z_2 < a_2$ или, если $z_2 = a_2$, тогда $z_1 > a_1$. Самая нижняя и самая левая точка (НЛ) множества K есть точка $z = (z_1, z_2) \in K$ такая, что для каждого $a = (a_1, a_2) \in K, z_2 < a_2$ или, если $z_2 = a_2$, тогда $z_1 < a_1$. Самая высокая и самая правая точка (ВП) множества K есть точка $z = (z_1, z_2) \in K$ такая, что для каждого $a = (a_1, a_2) \in K, z_2 > a_2$ или, если $z_2 = a_2$, тогда $z_1 > a_1$. Самая высокая и самая левая точка (ВЛ) множества K есть точка $z = (z_1, z_2) \in K$ такая, что для каждого $a = (a_1, a_2) \in K, z_2 > a_2$ или, если $z_2 = a_2$, тогда $z_1 < a_1$.

Пусть $(S)^*$ - множество всех слов $\alpha = \alpha(1)\alpha(2) \dots \alpha(k), k \geq 4$, над алфавитом $S = \{-1, 1\}$. Определим отображение $f : \mathbf{P} \rightarrow (S)^*$ следующим образом. Пусть $P \in \mathbf{P}$. Обходя полигон F_P в положительном направлении, начиная от самой нижней и самой правой точки, пронумеруем вершины полигона F_P так, что сопоставим -1 или 1, если угол в вершине $\pi/2$ или $-\pi/2$, соответственно.

Определим следующие семейства множеств (рис. 1):

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= \{P \in \mathbf{P} \mid \|P\| \geq 2, f(P) = (-1(-1,1)^{n-1}1(1,-1)^k-1), k, n \geq 0\} \\ \Phi_2 &= \{P \in \mathbf{P} \mid \|P\| \geq 2, f(P) = (-1(1,-1)^{n-1}1(1,-1)^k-1), k, n \geq 0\} \\ \Phi_3 &= \{P \in \mathbf{P} \mid \|P\| \geq 2, f(P) = (-1(-1,1)^n-1-1(-1,1)^k-1), k, n \geq 0\} \\ \Phi_4 &= \{P \in \mathbf{P} \mid \|P\| \geq 2, f(P) = (-1(1,-1)^n-1-1(-1,1)^k-1), k, n \geq 0\} \end{aligned}$$

где $(a, b)^n = \underbrace{(ab)(ab) \dots (ab)}_n, n \in N$.





Рис. 1.

Если $z_j = (x_j, y_j) \in \mathbb{Z}^2$, $j = 1, 2, 3, 4$ такие, что $y_2 = y_3$, $y_1 = y_4$ и $y_1 \leq y_2$, тогда обозначим $A_{\Phi_i}^{z_1, z_2, z_3, z_4} = \{K \in \Phi_i \mid z_1, z_2, z_3, z_4 - \text{НП, ВП, ВЛ, НЛ точка множества } K \text{ соответственно}\}$, $i \in \{1, \dots, 4\}$.

Пусть $z_i = (x_i, y_i) \in \mathbb{Z}^2$, $i = 1, 2, \dots, 30$ имеют свойства:



$$(8) \left\{ \begin{array}{l} y_{17} = y_{24} = y_{19} = y_2, \\ x_{17} \leq x_{24} < x_{19} - 1, \quad x_{19} \leq x_2, \\ y_4 > y_3 > y_2, \quad y_{15} > y_{16} > y_{17}, \\ y_{15} = y_{22} = y_{21} = y_4, \\ x_{15} \leq x_{22} < x_{21} - 1, \quad x_{21} \leq x_4, \\ y_{13} = y_{30} = y_{25} = y_6, \\ x_{13} \leq x_{30} < x_{25} - 1, \quad x_{25} \leq x_6, \\ y_8 > y_7 > y_6, \quad y_{11} > y_{12} > y_{13}, \\ y_{11} = y_{28} = y_{27} = y_8, \\ x_{11} \leq x_{28} < x_{27} - 1, \quad x_{27} \leq x_8 \end{array} \right.$$

Рис. 2.

Тогда,

$$K_8^{\{z_i\}_{i=1,30}} = \{K \in \mathbf{P} \mid K = \bigcup_{i=1}^{12} K_i^8, \quad K_1^8 \in A_{\Phi_4}^{z_1, z_2, z_{17}, z_{18}}, \quad K_2^8 \in A_{\Phi_2}^{z_2, z_3, z_{20}, z_{19}}, \quad K_3^8 \in A_{\Phi_3}^{z_3, z_4, z_{21}, z_{22}}, \quad K_4^8 \in A_{\Phi_1}^{z_4, z_5, z_{14}, z_{15}}, \quad K_5^8 \in A_{\Phi_2}^{z_{23}, z_{22}, z_{15}, z_{16}}, \quad K_6^8 \in A_{\Phi_3}^{z_{24}, z_{23}, z_{16}, z_{17}}, \quad K_7^8 \in A_{\Phi_4}^{z_5, z_6, z_{13}, z_{14}}, \quad K_8^8 \in A_{\Phi_2}^{z_6, z_7, z_{26}, z_{27}}, \quad K_9^8 \in A_{\Phi_3}^{z_7, z_8, z_{27}, z_{26}}, \quad K_{10}^8 \in A_{\Phi_1}^{z_8, z_9, z_{10}, z_{11}}, \quad K_{11}^8 \in A_{\Phi_2}^{z_{29}, z_{28}, z_{11}, z_{12}}, \quad K_{12}^8 \in A_{\Phi_3}^{z_{30}, z_{29}, z_{12}, z_{13}}\},$$

$$(x_1 = x_{18}) \Rightarrow (z_1 + (1, 1) \in K_1^8 \wedge z_1 + (-1, 1) \in K_1^8),$$

$$(z_3 + (0, 1) \notin K_3^8 \wedge z_3 + (0, -1) \notin K_2^8) \Rightarrow (z_3 + (-1, 1) \in K_3^8 \vee z_3 + (-1, -1) \in K_2^8),$$

$$(x_5 = x_{14}) \Rightarrow (z_5 + (1, -1) \in K_4^8 \wedge z_5 + (-1, -1) \in K_4^8),$$

$$(z_{16} + (0, 1) \notin K_5^8 \wedge z_{16} + (0, -1) \notin K_6^8) \Rightarrow (z_{16} + (1, 1) \in K_5^8 \vee z_{16} + (1, -1) \in K_6^8)$$

$$\begin{aligned} (z_7 + (0, 1) \notin K_9^8 \wedge z_7 + (0, -1) \notin K_8^8) \Rightarrow (z_7 + (-1, 1) \in K_9^8 \vee z_7 + (-1, -1) \in K_8^8), \\ (x_9 = x_{10}) \Rightarrow (z_9 + (1, -1) \in K_{10}^8 \wedge z_9 + (-1, -1) \in K_{10}^8), \\ (z_{12} + (0, 1) \notin K_{11}^8 \wedge z_{12} + (0, -1) \notin K_{12}^8) \Rightarrow (z_{12} + (1, 1) \in K_{11}^8 \vee z_6 + (1, -1) \in K_{12}^8) \end{aligned}$$

Определим класс π -лабиринтов \mathbf{C}_8 :

$$\mathbf{C}_8 = \{c : \mathbb{Z}^2 \rightarrow E^2 \mid c^{-1}(\{1\}) = K \in K_8^{\{z_i\}_{i=1,30}}, z_i \in \mathbb{Z}^2, i = 1, \dots, 30, \text{ и выполнено условие (8)}\}$$

Теорема 1. *Существует коллектив $(\mathbf{A}_8, \mathbf{K}_8)$ типа $(1, 1)$, который распознает класс $(\mathbf{C}_8, \text{НП}) = \{(c, p_{\text{НП}}) \mid c \in \mathbf{C}_8, p_{\text{НП}} - \text{самая нижняя и самая правая точка множества } c^{-1}(\{1\})\}$, где пешка \mathbf{A}_8 имеет 91 состояние, и любой лабиринт из класса $(\mathbf{C}_8, \text{НП})$ с n вершинами она обходит за время не меньшее $\begin{cases} 3/2(n - 11) + 29, & n = 2k + 11, & k \leq 1 \\ 3/2(n - 12) + 31, & n = 2k + 12, & k \geq 1 \end{cases}$ и не большее $\begin{cases} 9/2(n - 12) + 15, & n = 2k + 12, & k \leq 4 \\ 9/2(n - 13) + 19, & n = 2k + 13, & k \geq 5 \end{cases}$.*

2. Доказательство Теоремы 1

Так как мы будем рассматривать только регулярные пешки, можно пользоваться более короткой записью: входной алфавит есть множество $A = \{0, 1, \dots, 255\}$, полученное кодированием $\sum_{i=1}^8 a_i 2^{i-1}$ элементов $(1, a_1, \dots, a_8) \in (E^2)^9$.

Рассмотрим функционирование коллектива $(\mathbf{A}_8, \mathbf{K}_8)$, который будет построен на следующем этапе.

Из определения класса \mathbf{C}_8 следует, что если $c \in \mathbf{C}_8$, то множество $c^{-1}(\{1\})$ может быть разделено горизонтальными отрезками на подмножества $C_j, j \in (1, \dots, 12)$ так, что для каждого $j \in \{1, \dots, 12\}$ существует $l \in \{1, \dots, 4\}$ такое, что $C_j \in \Phi_l$. В [5, 6] показано, что существует пешка $\mathbf{A}_{\Phi_i} = (A, Q_i, B, \varphi_i, \psi_i, q_0, Q_F)$, которая распознает класс инициальных π -лабиринтов $(\Phi_i, \text{НП}) = \{(c, p_{\text{НП}}) \mid c^{-1}(\{1\}) \in \Phi_i, p_{\text{НП}} - \text{НП точка множества } c^{-1}(\{1\})\}, 1 \leq i \leq 4$.

Заметим, что окрестность точки, в которой автомат находится

– это единственная информация, которую автомат имеет в каждый момент времени. Автомат не имеет информации о том, находится ли он в «окрестности» бесконечной внешней области или в окрестности конечной дыры (следствием этого факта является теорема 1.1 [4]). Автомат нуждается в дополнительной информации, которая поможет ему при обходе конечной дыры в одном направлении (в нашей конструкции это отрицательное направление) понять, что он не «зациклился».

Пусть $c \in \mathbf{C}_8$ и $c^{-1}(\{1\}) = K$. Коллектив $(\mathbf{A}_8, \mathbf{K}_8)$ начинает движение в точке z_1 (НП точка). Обойдет множество K тем же самым способом, как в Лемме 1, при этом в некоторый момент автомат (и камень, который все время рядом с ним) будет в окрестности конечной дыры. Автомат-камень \mathbf{K}_8 тогда «отстает» в одной точке лабиринта и помнит, что автомат \mathbf{A}_8 был в этой точке. В конструкции автомата это случается в одном из состояний q_7, q_8, q_9 автомата \mathbf{A}_8 . Автомат \mathbf{A}_8 продолжает двигаться так же, как и автомат \mathbf{A}_0 из [6, теорема 1]. Состояния $q_i, i \in \{1, 2, \dots, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, \dots, 25\}$ автомата \mathbf{A}_8 совпадают с состояниями автомата \mathbf{A}_0 , и здесь мы не будем их описывать.

Далее, при обходе конечной дыры в том же самом направлении автомат \mathbf{A}_8 в некоторый момент снова окажется в точке, где находится камень \mathbf{K}_8 , то есть автомат \mathbf{A}_8 обойдет конечную дыру. В конструкции автомата это происходит в одном из состояний q_{22}, q_{24} .

Далее, автомат-камень \mathbf{K}_8 вместе с автоматом \mathbf{A}_8 обходит лабиринт. В дальнейшем движении коллектив снова окажется в окрестности конечной дыры (второй), где автоматы снова разделятся (автомат-камень \mathbf{K}_8 тогда «отстает» и ждет, а автомат \mathbf{A}_8 обходит конечную дыру). В конструкции автомата это происходит в одном из состояний $q_{48}, q_{56}, q_{57}, q_{58}$.

Затем автомат \mathbf{A}_8 опять обязательно попадает в камень. В конструкции автомата это происходит в одном из состояний q_{71}, q_{73} . После встречи с камнем автомат \mathbf{A}_8 продолжает движение, и при этом $q_i = q'_{i-49}, i \in \{51, 52, \dots, 66, 68, 69, 70, 74, 75, \dots, 89\}$, где через q'_j обозначены состояния которые идентичны состояниям $q_j, j \in \{2, 3, \dots, 17, 19, 20, 21, 25, 26, \dots, 40\}$ из конструкции автомата \mathbf{A}_0 [6].

Построим коллектив $\mathbf{S}_8 = (\mathbf{A}_8, \mathbf{K}_8)$.

В описании автомата \mathbf{A}_8 предполагается существование «приоритета» между входными буквами в некотором состоянии, который определяем через понятие «описан раньше». Воспользуемся кодировкой, которую мы ввели выше. Для элемента входного алфавита автомата \mathbf{A}_8 можно пользоваться более короткой записью (s, a) , где $s = \lambda$ (пустой символ) или $s = q_{k_8}$; $Q_{\mathbf{K}_8} = \{q_{k_8}\}$, $a \in \{0, 1, \dots, 255\}$. Также в описании автомата \mathbf{A}_8 опустим код состояния автомата-камня \mathbf{K}_8 ; будем писать его только в части функционирования автомата \mathbf{A}_8 , где оно зависит от автомата-камня \mathbf{K}_8 .

Коллектив $\mathbf{S}_8 = (\mathbf{A}_8, \mathbf{K}_8)$ построим следующим образом:

$$Q_8 = \{q_i \mid i \in \{1, \dots, 89\}\} \cup Q_F,$$

$$\varphi_8(q_{11}, a) = q_{11}; \psi_8(q_{11}, a) = w \text{ для } a \in \{214, 66, 194, 210, 248, 104, 232, 203, 215, 211, 67, 195, 216, 200, 72, 255, 223, 251, 219, 107, 75, 235, 249, 233, 105, 217, 201, 73\},$$

$$\varphi_8(q_{11}, a) = q_{11}; \psi_8(q_{11}, a) = n \text{ для } a \in \{18, 19, 24, 25, 28, 29, 27, 146, 147, 152, 153, 155\},$$

$$\varphi_8(q_{11}, a) = q_{12}; \psi_8(q_{11}, a) = e \text{ для } a \in \{22, 23, 31, 150, 151, 159\},$$

$$\varphi_8(q_{11}, a) = q_{13}; \psi_8(q_{11}, a) = w \text{ для } a \in \{253, 125, 221, 93, 95, 127, 88, 92, 220, 252, 124, 120, 121, 89\},$$

$$\varphi_8(q_{11}, a) = q_{15}; \psi_8(q_{11}, a) = e \text{ для } a \in \{10, 14, 30\},$$

$$\varphi_8(q_{11}, a) = q_{17}; \psi_8(q_{11}, a) = e \text{ для } a \in \{26, 154, 158\},$$

$$\varphi_8(q_{11}, a) = q_{F_0}; \psi_8(q_{11}, a) = \mathbf{0} \text{ иначе,}$$

$$\varphi_8(q_{15}, a) = q_{15}; \psi_8(q_{15}, a) = e \text{ для } a \in \{246, 63, 30, 10, 14, 110, 111, 214, 66, 70, 86, 254, 126, 127, 106, 107, 43, 47, 62, 46, 42, 255, 31, 15, 11, 118, 98, 102\},$$

$$\varphi_8(q_{15}, a) = q_{15}; \psi_8(q_{15}, a) = n \text{ для } a \in \{56, 60, 124, 120, 24, 28, 112, 116, 80, 84\},$$

$$\varphi_8(q_{15}, a) = q_{16}; \psi_8(q_{15}, a) = w \text{ для } a \in \{208, 212, 240, 244, 248, 252\},$$

$$\varphi_8(q_{15}, a) = q_{17}; \psi_8(q_{15}, a) = e \text{ для } a \in \{154, 158, 26, 186, 190, 58, 59, 155, 159, 187, 191, 215, 211, 210, 250, 251, 242, 243, 247, 99, 103, 114, 115, 119, 122, 123, 67, 71, 82, 83, 87, 250\},$$

$$\varphi_8(q_{15}, a) = q_{F_0}; \psi_8(q_{15}, a) = \mathbf{0} \text{ иначе,}$$

$$\varphi_8(q_{17}, a) = q_{17}; \psi_8(q_{17}, a) = e \text{ для } a \in \{66, 67, 70, 71, 86, 87, 98, 99, 102, 103, 106, 107, 110, 111, 118, 119, 126, 127, 214, 215, 246, 247, 254, 255, 234,$$

235, 238, 239, 194, 195, 198, 199, 226, 227, 230, 231, 242, 243, 251},
 $\varphi_8(q_{17}, a) = q_{18}$; $\psi_8(q_{17}, a) = s$ для $a \in \{93, 95, 75, 79, 203, 207, 220, 216,$
 88, 89, 92, 219, 223, 221, 217, 72, 73, 91, 200, 201},

$\varphi_8(q_{17}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{17}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{25}, a) = q_{25}$; $\psi_8(q_{25}, a) = n$ для $a \in \{b \in A \mid 24 \leq b \leq 31 \text{ или } 56 \leq$
 $b \leq 63 \text{ или } 80 \leq b \leq 95 \text{ или } 112 \leq b \leq 127\}$,

$\varphi_8(q_{25}, a) = q_{26}$; $\psi_8(q_{25}, a) = n$ для $a \in \{b \in A \mid 144 \leq b \leq$
 $159 \text{ или } 184 \leq b \leq 191\}$,

$\varphi_8(q_{25}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{25}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{26}, a) = q_{26}$; $\psi_8(q_{26}, a) = w$ для $a \in \{b \in A \mid 64 \leq b \leq$
 $103 \text{ или } 112 \leq b \leq 119 \text{ или } 192 \leq b \leq 231 \text{ или } 240 \leq b \leq 247\}$,

$\varphi_8(q_{26}, a) = q_{26}$; $\psi_8(q_{26}, a) = n$ для $a \in \{b \in A \mid 16 \leq b \leq 25 \text{ или } b =$
 $27 \text{ или } b = 28 \text{ или } b = 29 \text{ или } b = 31 \text{ или } 144 \leq b \leq 159\}$,

$\varphi_8(q_{26}, a) = q_{46}$; $\psi_8(q_{26}, a) = e$ для $a \in \{26, 58, 186, 190, 154, 158\}$,

$\varphi_8(q_{26}, a) = q_{27}$; $\psi_8(q_{26}, a) = w$ для $a \in \{106, 110, 122, 126, 234, 250, 254,$
 238},

$\varphi_8(q_{26}, a) = q_{30}$; $\psi_8(q_{26}, a) = e$ для $a \in \{10, 42\}$,

$\varphi_8(q_{26}, a) = q_{28}$; $\psi_8(q_{26}, a) = e$ для $a \in \{14, 30, 46, 62\}$,

$\varphi_8(q_{26}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{26}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{27}, a) = q_{27}$; $\psi_8(q_{27}, a) = w$ для $a \in \{107, 111, 127, 123, 235, 239, 251,$
 255},

$\varphi_8(q_{27}, a) = q_{28}$; $\psi_8(q_{27}, a) = e$ для $a \in \{15, 31, 63, 47\}$,

$\varphi_8(q_{27}, a) = q_{46}$; $\psi_8(q_{27}, a) = e$ для $a \in \{27, 187, 59, 155, 159, 191\}$,

$\varphi_8(q_{27}, a) = q_{30}$; $\psi_8(q_{27}, a) = e$ для $a \in \{11, 43\}$,

$\varphi_8(q_{27}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{27}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{28}, a) = q_{28}$; $\psi_8(q_{28}, a) = e$ для $a \in \{254, 255, 246, 247, 214, 215, 126,$
 127, 118, 119, 86, 87},

$\varphi_8(q_{28}, a) = q_{29}$; $\psi_8(q_{28}, a) = e$ для $a \in \{122, 123, 114, 115, 82, 83, 250,$
 251, 242, 243, 210, 211},

$\varphi_8(q_{28}, a) = q_{31}$; $\psi_8(q_{28}, a) = e$ для $a \in \{95, 223\}$,

$\varphi_8(q_{28}, a) = q_{32}$; $\psi_8(q_{28}, a) = e$ для $a \in \{91, 219\}$,

$\varphi_8(q_{28}, a) = q_{36}$; $\psi_8(q_{28}, a) = n$ для $a \in \{216, 217\}$,

$\varphi_8(q_{28}, a) = q_{53}$; $\psi_8(q_{28}, a) = n$ для $a \in \{220, 221\}$,

$\varphi_8(q_{28}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{28}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{29}, a) = q_{29}$; $\psi_8(q_{29}, a) = e$ для $a \in \{234, 235, 226, 227, 194, 195, 106,$

107, 98, 99, 66, 67},

$\varphi_8(q_{29}, a) = q_{32}$; $\psi_8(q_{29}, a) = e$ для $a \in \{203, 75\}$,

$\varphi_8(q_{29}, a) = q_{46}$; $\psi_8(q_{29}, a) = e$ для $a \in \{239, 207, 231, 238, 199, 230, 198, 111, 110, 102, 70, 71, 103, 79\}$,

$\varphi_8(q_{29}, a) = q_{35}$; $\psi_8(q_{29}, a) = w$ для $a \in \{200, 201, 72, 73\}$,

$\varphi_8(q_{29}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{29}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{30}, a) = q_{30}$; $\psi_8(q_{30}, a) = e$ для $a \in \{66, 67, 98, 99, 106, 107\}$,

$\varphi_8(q_{30}, a) = q_{28}$; $\psi_8(q_{30}, a) = e$ для $a \in \{110, 111, 102, 103, 70, 71\}$,

$\varphi_8(q_{30}, a) = q_{31}$; $\psi_8(q_{30}, a) = e$ для $a = 79$,

$\varphi_8(q_{30}, a) = q_{33}$; $\psi_8(q_{30}, a) = e$ для $a = 75$,

$\varphi_8(q_{30}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{30}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{31}, a) = q_{36}$; $\psi_8(q_{31}, a) = n$ для $a \in \{248, 249\}$,

$\varphi_8(q_{31}, a) = q_{53}$; $\psi_8(q_{31}, a) = n$ для $a \in \{252, 253\}$,

$\varphi_8(q_{31}, a) = q_{31}$; $\psi_8(q_{31}, a) = e$ для $a \in \{127, 255\}$,

$\varphi_8(q_{31}, a) = q_{32}$; $\psi_8(q_{31}, a) = e$ для $a \in \{123, 251\}$,

$\varphi_8(q_{31}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{31}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{32}, a) = q_{35}$; $\psi_8(q_{32}, a) = w$ для $a \in \{72, 73, 104, 105, 232, 233\}$,

$\varphi_8(q_{32}, a) = q_{32}$; $\psi_8(q_{32}, a) = e$ для $a \in \{107, 235\}$,

$\varphi_8(q_{32}, a) = q_{47}$; $\psi_8(q_{32}, a) = e$ для $a = 111$,

$\varphi_8(q_{32}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{32}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{33}, a) = q_{33}$; $\psi_8(q_{33}, a) = e$ для $a = 107$,

$\varphi_8(q_{33}, a) = q_{34}$; $\psi_8(q_{33}, a) = e$ для $a = 111$,

$\varphi_8(q_{33}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{33}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{34}, a) = q_{34}$; $\psi_8(q_{34}, a) = e$ для $a \in \{127, 255\}$,

$\varphi_8(q_{34}, a) = q_{36}$; $\psi_8(q_{34}, a) = n$ для $a \in \{248, 249\}$,

$\varphi_8(q_{34}, a) = q_{32}$; $\psi_8(q_{34}, a) = e$ для $a \in \{123, 251\}$,

$\varphi_8(q_{34}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{34}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{35}, a) = q_{36}$; $\psi_8(q_{35}, a) = n$ для $a \in \{210, 114, 115, 122, 123, 82, 242, 243, 250, 251, 219, 83, 211, 91\}$,

$\varphi_8(q_{35}, a) = q_{35}$; $\psi_8(q_{35}, a) = w$ для $a \in \{b \in A \mid b = a_0 + a_1 2 + a_2 2^2 + a_3 2^3 + a_4 2^4 + a_5 2^5 + a_6 2^6 + a_7 2^7, a_6 = 1\}$,

$\varphi_8(q_{35}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{35}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{36}, a) = q_{36}$; $\psi_8(q_{36}, a) = n$ для $a = 123$,

$\varphi_8(q_{36}, a) = q_{36}$; $\psi_8(q_{36}, a) = w$ для $a \in \{104, 105, 107, 232, 233, 235\}$,

$$\begin{aligned}\varphi_8(q_{36}, a) &= q_{37}; \psi_8(q_{36}, a) = w \text{ для } a \in \{248, 249, 251\}, \\ \varphi_8(q_{36}, a) &= q_{48}; \psi_8(q_{36}, a) = w \text{ для } a \in \{120, 121, 124, 125\}, \\ \varphi_8(q_{36}, a) &= q_{42}; \psi_8(q_{36}, a) = w \text{ для } a \in \{252, 253\}, \\ \varphi_8(q_{36}, a) &= q_{40}; \psi_8(q_{36}, a) = s \text{ для } a = 189, \\ \varphi_8(q_{36}, a) &= q_{F_0}; \psi_8(q_{36}, a) = \mathbf{0} \text{ иначе,}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi_8(q_{37}, a) &= q_{37}; \psi_8(q_{37}, a) = w \text{ для } a = 255, \\ \varphi_8(q_{37}, a) &= q_{39}; \psi_8(q_{37}, a) = e \text{ для } a \in \{31, 63\}, \\ \varphi_8(q_{37}, a) &= q_{50}; \psi_8(q_{37}, a) = e \text{ для } a \in \{159, 191\}, \\ \varphi_8(q_{37}, a) &= q_{38}; \psi_8(q_{37}, a) = w \text{ для } a = 127, \\ \varphi_8(q_{37}, a) &= q_{F_0}; \psi_8(q_{37}, a) = \mathbf{0} \text{ иначе,}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi_8(q_{38}, a) &= q_{38}; \psi_8(q_{38}, a) = w \text{ для } a \in \{107, 111\}, \\ \varphi_8(q_{38}, a) &= q_{39}; \psi_8(q_{38}, a) = e \text{ для } a \in \{11, 15, 43, 47\}, \\ \varphi_8(q_{38}, a) &= q_{44}; \psi_8(q_{38}, a) = w \text{ для } a \in \{239, 235\}, \\ \varphi_8(q_{38}, a) &= q_{F_0}; \psi_8(q_{38}, a) = \mathbf{0} \text{ иначе,}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi_8(q_{39}, a) &= q_{36}; \psi_8(q_{39}, a) = n \text{ для } a \in \{248, 249, 251\}, \\ \varphi_8(q_{39}, a) &= q_{39}; \psi_8(q_{39}, a) = e \text{ для } a \in \{b \in A \mid b = a_0 + a_1 2 + a_2 2^2 + \\ &+ a_3 2^3 + a_4 2^4 + a_5 2^5 + a_6 2^6 + a_7 2^7, a_1 = 1\}, \\ \varphi_8(q_{39}, a) &= q_{F_0}; \psi_8(q_{39}, a) = \mathbf{0} \text{ иначе,}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi_8(q_{40}, a) &= q_{40}; \psi_8(q_{40}, a) = w \text{ для } a \in \{82, 83, 91, 114, 115, 122, 123, \\ &70, 71, 79, 102, 103, 110, 111, 66, 67, 75, 98, 99, 106, 107\}, \\ \varphi_8(q_{40}, a) &= q_{41}; \psi_8(q_{40}, a) = e \text{ для } a \in \{10, 11, 14, 15, 42, 43, 46, 47\}, \\ \varphi_8(q_{40}, a) &= q_{F_0}; \psi_8(q_{40}, a) = \mathbf{0} \text{ иначе,}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi_8(q_{41}, a) &= q_{53}; \psi_8(q_{41}, a) = n \text{ для } a = 189, \\ \varphi_8(q_{41}, a) &= q_{41}; \psi_8(q_{41}, a) = n \text{ для } a \in \{122, 123, 114, 115, 82, 83, 91\}, \\ \varphi_8(q_{41}, a) &= q_{41}; \psi_8(q_{41}, a) = e \text{ для } a \in \{b \in A \mid b = a_0 + a_1 2 + a_2 2^2 + \\ &+ a_3 2^3 + a_4 2^4 + a_5 2^5 + a_6 2^6 + a_7 2^7, a_1 = 1\}, \\ \varphi_8(q_{41}, a) &= q_{F_0}; \psi_8(q_{41}, a) = \mathbf{0} \text{ иначе,}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi_8(q_{42}, a) &= q_{42}; \psi_8(q_{42}, a) = w \text{ для } a = 255, \\ \varphi_8(q_{42}, a) &= q_{43}; \psi_8(q_{42}, a) = e \text{ для } a \in \{31, 191, 63, 159\}, \\ \varphi_8(q_{42}, a) &= q_{48}; \psi_8(q_{42}, a) = w \text{ для } a = 127, \\ \varphi_8(q_{42}, a) &= q_{F_0}; \psi_8(q_{42}, a) = \mathbf{0} \text{ иначе,}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi_8(q_{43}, a) &= q_{43}; \psi_8(q_{43}, a) = e \text{ для } a = 255, \\ \varphi_8(q_{43}, a) &= q_{53}; \psi_8(q_{43}, a) = n \text{ для } a \in \{252, 253\}, \\ \varphi_8(q_{43}, a) &= q_{F_0}; \psi_8(q_{43}, a) = \mathbf{0} \text{ иначе,}\end{aligned}$$

$\varphi_8(q_{44}, a) = q_{44}$; $\psi_8(q_{44}, a) = w$ для $a \in \{251, 255\}$,
 $\varphi_8(q_{44}, a) = q_{45}$; $\psi_8(q_{44}, a) = e$ для $a \in \{31, 191, 27, 63, 159, 187, 59, 155\}$,
 $\varphi_8(q_{44}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{44}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{45}, a) = q_{48}$; $\psi_8(q_{45}, a) = w$ для $a \in \{248, 249\}$,
 $\varphi_8(q_{45}, a) = q_{45}$; $\psi_8(q_{45}, a) = e$ для $a \in \{b \in A \mid b = a_0 + a_1 2 + a_2 2^2 + a_3 2^3 + a_4 2^4 + a_5 2^5 + a_6 2^6 + a_7 2^7, a_1 = 1\}$,
 $\varphi_8(q_{45}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{45}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{46}, a) = q_{48}$; $\psi_8(q_{46}, a) = w$ для $a \in \{216, 217, 220, 221, 88, 89, 92, 93\}$,
 $\varphi_8(q_{46}, a) = q_{47}$; $\psi_8(q_{46}, a) = e$ для $a \in \{223, 79, 95, 75, 219, 203, 207\}$,
 $\varphi_8(q_{46}, a) = q_{46}$; $\psi_8(q_{46}, a) = e$ для $a \in \{b \in A \mid b = a_0 + a_1 2 + a_2 2^2 + a_3 2^3 + a_4 2^4 + a_5 2^5 + a_6 2^6 + a_7 2^7, a_1 = 1\}$,
 $\varphi_8(q_{46}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{46}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{47}, a) = q_{47}$; $\psi_8(q_{47}, a) = e$ для $a \in \{111, 127, 107, 251, 235, 255, 239\}$,
 $\varphi_8(q_{47}, a) = q_{48}$; $\psi_8(q_{47}, a) = w$ для $a \in \{248, 249, 252, 253, 120, 121, 124, 125\}$,
 $\varphi_8(q_{47}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{47}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{48}, a) = q_{48}$; $\psi_8(q_{48}, a) = w$ для $a \in \{255, 127, 223, 95, 111, 79, 247, 119, 215, 87, 103, 71, 67, 99, 75, 107, 126, 254, 110, 246, 214, 118, 86, 70, 102, 106, 98, 66\}$,
 $\varphi_8(q_{48}, a) = q_{50}$; $\psi_8(q_{48}, a) = e$ для $a \in \{158, 159, 190, 191\}$,
 $\varphi_8(q_{48}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{48}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{49}, a) = q_{49}$; $\psi_8(q_{49}, a) = w$ для $a \in \{251, 211, 243, 250, 210, 242, 255, 214, 246, 254, 219, 215, 247, 223\}$,
 $\varphi_8(q_{49}, a) = q_{50}$; $\psi_8(q_{49}, a) = e$ для $a \in \{30, 31, 62, 63, 158, 159, 190, 191\}$,
 $\varphi_8(q_{49}, a) = q_{60}$; $\psi_8(q_{49}, a) = n$ для $a \in \{187, 155, 59, 27, 186, 154, 58, 26\}$,
 $\varphi_8(q_{49}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{49}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{50}, a) = q_{60}$; $\psi_8(q_{50}, a) = n$ для $a \in \{251, 211, 243, 250, 210, 242, 219\}$,
 $\varphi_8(q_{50}, a) = q_{53}$; $\psi_8(q_{50}, a) = n$ для $a \in \{216, 217, 220, 221, 248, 249, 252, 253\}$,
 $\varphi_8(q_{50}, a) = q_{50}$; $\psi_8(q_{50}, a) = e$ для $a \in \{b \in A \mid b = a_0 + a_1 2 + a_2 2^2 + a_3 2^3 + a_4 2^4 + a_5 2^5 + a_6 2^6 + a_7 2^7, a_1 = 1\}$,
 $\varphi_8(q_{50}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{50}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{67}, a) = q_{67}$; $\psi_8(q_{67}, a) = e$ для $a \in \{107, 66, 67, 75, 31, 22, 23, 235, 203, 194, 195, 27, 18, 19, 255, 251, 223, 219, 214, 210, 215, 211, 159, 151, 150, 155, 146, 147\}$,

$\varphi_8(q_{67}, a) = q_{67}$; $\psi_8(q_{67}, a) = s$ для $a \in \{24, 25, 72, 73, 152, 153, 216, 217, 200, 201, 184, 56\}$,

$\varphi_8(q_{67}, a) = q_{68}$; $\psi_8(q_{67}, a) = w$ для $a \in \{104, 105, 232, 233, 248, 249\}$,

$\varphi_8(q_{67}, a) = q_{69}$; $\psi_8(q_{67}, a) = e$ для $a \in \{154, 158, 30, 62, 63, 59, 58, 26, 254, 250, 186, 187, 190, 191\}$,

$\varphi_8(q_{67}, a) = q_{71}$; $\psi_8(q_{67}, a) = w$ для $a \in \{80, 112, 120\}$,

$\varphi_8(q_{67}, a) = q_{73}$; $\psi_8(q_{67}, a) = w$ для $a \in \{88, 89, 121\}$,

$\varphi_8(q_{67}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{67}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{71}, a) = q_{71}$; $\psi_8(q_{71}, a) = w$ для $a \in \{246, 66, 98, 120, 80, 112, 106, 107, 255, 127, 254, 126, 214, 86, 118, 248, 240, 208, 70, 102, 110, 124, 116, 84, 252, 244, 212, 111\}$,

$\varphi_8(q_{71}, a) = q_{71}$; $\psi_8(q_{71}, a) = s$ для $a \in \{14, 46, 28, 60, 62, 30, 24, 56, 10, 42\}$,

$\varphi_8(q_{71}, a) = q_{72}$; $\psi_8(q_{71}, a) = e$ для $a \in \{11, 15, 31, 43, 47, 63\}$,

$\varphi_8(q_{71}, a) = q_{73}$; $\psi_8(q_{71}, a) = w$ для $a \in \{222, 78, 95, 223, 94, 74, 79, 75, 253, 221, 249, 217, 125, 92, 93, 121, 88, 89, 216, 220\}$,

$\varphi_8(q_{71}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{71}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{72}, a) = q_{71}$; $\psi_8(q_{72}, a) = s$ для $a \in \{126, 120, 106, 124, 252, 248, 110, 254\}$,

$\varphi_8(q_{72}, a) = q_{72}$; $\psi_8(q_{72}, a) = e$ для $a \in \{b \in A \mid b = a_0 + a_1 2 + a_2 2^2 + a_3 2^3 + a_4 2^4 + a_5 2^5 + a_6 2^6 + a_7 2^7, a_1 = 1\}$,

$\varphi_8(q_{72}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{72}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

$\varphi_8(q_{73}, a) = q_{73}$; $\psi_8(q_{73}, a) = w$ для $a \in \{b \in A \mid b = a_0 + a_1 2 + a_2 2^2 + a_3 2^3 + a_4 2^4 + a_5 2^5 + a_6 2^6 + a_7 2^7, a_6 = 1\}$,

$\varphi_8(q_{73}, a) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{73}, a) = \mathbf{0}$ иначе,

Пусть $M = \{194, 195, 198, 199, 202, 203, 206, 207, 226, 230, 234, 235, 238, 239\} \subseteq A$. Тогда, $\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_i\}, a)) = \psi_8(q_i, (\{q_{k8}\}, a))$ для $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $a \in A$,

$\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_7\}, a)) = \mathbf{0}$, $a \in M_1 = \{202, 206, 234, 238, 194, 198, 226, 230\} \subset M$,

$\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_7\}, a)) = \psi_8(q_7, (\{q_{k8}\}, a))$ для $a \notin M_1$,

$\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_8\}, a)) = \mathbf{0}$, $a \in M_1 = \{195, 194, 203, 239, 207, 235\} \subset M$,
 $\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_8\}, a)) = \psi_8(q_8, (\{q_{k8}\}, a))$ для $a \notin M_1$,
 $\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_9\}, a)) = \mathbf{0}$, $a \in M_1 = \{195, 194, 203, 239, 207, 235, 198, 199\} \subset M$,
 $\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_9\}, a)) = \psi_8(q_9, (\{q_{k8}\}, a))$ для $a \notin M_1$,
 $\varphi_8(q_{22}, (\{q_{k8}\}, a)) = q_{25}$; $\psi_8(q_{22}, (\{q_{k8}\}, a)) = e$ для $a \in M \setminus \{195, 199\}$
 $\varphi_8(q_{22}, (\{\lambda\}, a)) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{22}, (\{\lambda\}, a)) = \mathbf{0}$ для $a \in M \setminus \{195, 199\}$, то
 есть если автоматы $\mathbf{A}_8, \mathbf{K}_8$ не встретятся,
 $\varphi_8(q_{24}, (\{q_{k8}\}, a)) = q_{25}$; $\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_{24}\}, a)) = \psi_8(q_{24}, (\{q_{k8}\}, a)) =$
 e для $a \in \{194, 195, 198, 199\} \subset M$,
 $\varphi_8(q_{24}, (\{\lambda\}, a)) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{24}, (\{\lambda\}, a)) = \mathbf{0}$ для $a \in \{194, 195, 198, 199\}$,
 то есть если автоматы $\mathbf{A}_8, \mathbf{K}_8$ не встретятся,

Пусть $M = \{194, 195, 198, 199, 202, 203, 206, 207, 226, 227, 230, 231, 234, 235, 238, 239\} \subseteq A$. Тогда, $\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_i\}, a)) = \psi_8(q_i, (\{q_{k8}\}, a))$
 для $i \in \{25, 26, \dots, 47\}$, $a \in A$,

$\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_{48}\}, a)) = \mathbf{0}$, $a \in M \setminus \{202, 206\}$,
 $\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_{48}\}, a)) = \psi_8(q_{48}, (\{q_{k8}\}, a))$ для $a \notin M \setminus \{202, 206\}$,
 $\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_i\}, a)) = \psi_8(q_i, (\{q_{k8}\}, a))$ для $i \in \{50, 51, \dots, 55\}$, $a \in A$,
 $\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_{56}\}, a)) = \mathbf{0}$, $a \in M_1 = \{202, 206, 234, 238, 194, 198, 226, 230\} \subset M$,
 $\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_{56}\}, a)) = \psi_8(q_{56}, (\{q_{k8}\}, a)) = \psi_8(q_{56}, a)$ для $a \notin M_1$,
 $\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_{57}\}, a)) = \mathbf{0}$, $a \in M_1 = \{195, 194, 203, 239, 207, 235, 198, 199\} \subset M$,
 $\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_{57}\}, a)) = \psi_8(q_{57}, (\{q_{k8}\}, a))$ для $a \notin M_1$,
 $\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_{58}\}, a)) = \mathbf{0}$, $a \in M_1 = \{195, 194, 203, 239, 207, 235, 198, 199\} \subset M$,
 $\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_{58}\}, a)) = \psi_8(q_{58}, (\{q_{k8}\}, a)) = \psi_8(q_{58}, a)$ для $a \notin M_1$,
 $\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_{71}\}, a)) = \mathbf{0}$, $a \in A$
 $\varphi_8(q_{71}, (\{q_{k8}\}, a)) = q_{74}$; $\psi_8(q_{71}, (\{q_{k8}\}, a)) = e$ для $a \in M \setminus \{195, 199, 227, 231\}$
 $\varphi_8(q_{71}, (\{\lambda\}, a)) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{71}, (\{\lambda\}, a)) = \mathbf{0}$ для $a \in M \setminus \{195, 199, 227, 231\}$, то есть если автоматы $\mathbf{A}_8, \mathbf{K}_8$ не встретятся,
 $\psi_{k8}(q_{k8}, (\{q_{73}\}, a)) = \mathbf{0}$, $a \in A$.
 $\varphi_8(q_{73}, (\{q_{k8}\}, a)) = q_{74}$; $\psi_8(q_{73}, (\{q_{k8}\}, a)) = e$ для $a \in M$,
 $\varphi_8(q_{73}, (\{\lambda\}, a)) = q_{F_0}$; $\psi_8(q_{73}, (\{\lambda\}, a)) = \mathbf{0}$ для $a \in M$, то есть если
 автоматы $\mathbf{A}_8, \mathbf{K}_8$ не встретятся.

Коллектив $S_8 = (A_8, K_8)$ при распознавании лабиринта $c \in C_8$ обходит этот лабиринт и производит различные проверки. При этом некоторые вершины автомата посещает несколько раз (после встречи с камнем K_8 автомат A_8 должен вернуться в некоторую вершину и продолжить обход и проверку лабиринта c). Значит, для каждого лабиринта $c \in C_8$ верно, что хотя бы одну из вершин лабиринта c автомат A_8 посещает не меньше, чем два раза. Также, для $n \geq 22$, $n \in \mathbb{N}$, можно построить лабиринт $c' \in C_8$ такой, что некоторую из вершин лабиринта c' автомат A_8 будет посещать пять раз. Таким свойством обладают лабиринты $c'' \in C_8$, для которых $\|K_4^8 \cap K_7^8\|$, где $c''^{-1}(\{1\}) = \bigcup_{i=1}^{12} K_i^8$ (см. определение класса C_8).

Из предыдущего вытекает, что для каждого $n \geq 13$ всегда можно построить лабиринты $L, L' \in C_8$ такие, что $\|V(L)\| = \|V(L')\| = n$, и время обхода для лабиринта L будет минимальным, а для лабиринта L' – максимальным.

Список литературы

- [1] Килибарда Г. Об обходе конечных лабиринтов системами автоматов // Дискретная математика. 1990. Т. 2. Вып. 2. С. 71 – 81.
- [2] Кудрявцев В.Б., Подколзин А.С., Ушчумлич Ш. Введение в теорию абстрактных автоматов. М.: Наука, 1985.
- [3] Кудрявцев В.Б., Алешин С.В., Подколзин А.С. Введение в теорию автоматов. М.: Наука, 1985.
- [4] Стаматович Б. О распознавании лабиринтов автоматами // Дискретная математика. (в печати).
- [5] Стаматович Б. Распознавание односвязных цифр автоматом // Интеллектуальные системы. 1998. Т. 3. Вып. 3 – 4. С. 291 – 305.
- [6] Стаматович Б. Распознавание двусвязных цифр коллективами автоматов // Интеллектуальные системы. 1999. Т. 4. Вып. 1 – 2. С. 321 – 337.