

О темпах роста структур с конечным числом существенных ограничений

С. А. Комков¹

Для конечного множества A с заданным на нём множеством операций M определена функция, называемая темпом роста. Порядок роста этой функции характеризует силу и исчислимость множества операций. Показано, что если среди множества всех предикатов, сохраняемых всеми функциями из M , встречается лишь конечное число важных существенных предикатов, то темп роста пары (A, M) имеет логарифмический порядок.

Ключевые слова: темп роста, конечные множества, язык ограничений, логарифмический темп роста.

1. Введение

Рассмотрим декартову степень $n \in \mathbb{N}$ конечного множества A с заданным на нём множеством операций M . Элементы A^n называют *наборами*. Применяя операции из M к уже имеющимся наборам покоординатно, можно получать новые наборы:

$$\left(\begin{array}{c} a_1^1 \\ \vdots \\ a_n^1 \end{array} \right), \dots, \left(\begin{array}{c} a_1^k \\ \vdots \\ a_n^k \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{c} f(a_1^1, \dots, a_1^k) \\ \vdots \\ f(a_n^1, \dots, a_n^k) \end{array} \right), \quad f \in M.$$

Также можно получать новые наборы с помощью уже полученных наборов.

Темпом роста пары (A, M) называют функцию $d_{(A,M)}(n)$, $n \in \mathbb{N}$. Для каждого n функция $d_{(A,M)}(n)$ равна минимальному числу наборов, из которых можно итеративно получить всё A^n , применяя операции из M покоординатно. Таким образом, порядок темпа роста характеризует силу и исчислимость заданного множества операций.

Пример 1. Пусть $A = \{0, 1\}$, $M = \{\neg\}$. Тогда $d_{(A,M)}(n) = 2^{n-1}$.

Пример 2. Пусть $A = \{0, 1, 2\}$, $M = \{+\text{mod } 3\}$. Тогда $d_{(A,M)}(n) = n$.

Темп роста — не просто количественная характеристика. PSPACE-полная задача может быть сведена к NP-полной задаче в зависимости от

¹Комков Степан Алексеевич — аспирант каф. математической теории интеллектуальных систем мех.-мат. ф-та МГУ, e-mail: stepan.komkov@intsys.msu.ru.

Kotkov Stepan Alekseevich — graduate student, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Mechanics and Mathematics, Chair of Mathematical Theory of Intellectual Systems.

темпа роста некоторой её внутренней структуры. Эта зависимость была показана Хьюби Ченом [1] на основе подкванторной задачи удовлетворения ограничений (QCSP) и задачи удовлетворения ограничений (CSP).

Задача QCSP заключается в проверке выполнимости формулы

$$\forall x_1 \dots \forall x_m \exists x_{m+1} \dots \exists x_n \left(R_1(x_{i_1^1}, \dots, x_{i_1^1}) \wedge \dots \wedge R_p(x_{i_p^p}, \dots, x_{i_p^p}) \right). \quad (1)$$

Здесь R_i , $1 \leq i \leq p$ — это предикаты, заданные на некотором конечном множестве A . Известно, что QCSP является PSPACE-полной задачей.

CSP является частным случаем QCSP, где в проверяемой формуле отсутствуют кванторы всеобщности. Известно, что CSP является NP-полной задачей.

Допустим, что среди предикатов формулы (1) могут встречаться не любые предикаты, а только предикаты из некоторого подмножества всех предикатов. С помощью соответствия Галуа [2, 3] этому подмножеству предикатов можно сопоставить замкнутое множество операций M на множестве A . В [1] показано, что если темп роста пары (A, M) ограничен сверху полиномом, то в этом случае QCSP задача сводится к CSP задаче за полиномиальное время.

Данный результат показывает важность и актуальность изучения темпов роста произвольных конечных замкнутых множеств с заданными на них операциями.

В настоящей работе изучаются темпы роста таких конечных структур, что их множество операций сохраняет лишь конечное число важных существенных предикатов. В терминах QCSP это означает, что язык ограничений содержит лишь конечно число важных существенных предикатов, что является интересным крайним случаем.

2. Основные понятия и формулировка результата

В дальнейшем без утери общности будем полагать, что $A = E_k = \{0, 1, \dots, k-1\}$.

Замечание. $d_{(E_k, M)}(n) \geq \lceil \log_k n \rceil$, $k \geq 2$.

Отображение $\rho : E_k^n \rightarrow \{0, 1\}$ называют *предикатом арности n* .

Говорят, что операция f *сохраняет предикат ρ арности n* , если для любых таких наборов $a^1, \dots, a^m \in E_k^n$, что $a^i \in \rho$, $1 \leq i \leq m$, выполняется $(f(a_1^1, \dots, a_1^m), \dots, f(a_n^1, \dots, a_n^m))^T \in \rho$. Классы функций могут быть описаны через предикаты, которые они сохраняют [4].

Пусть R — множество предикатов, а M — множество операций. Через $\text{Pol}(R)$ обозначают множество всех операций, сохраняющих каждый

предикат из R . Через $\text{Inv}(M)$ обозначают множество всех предикатов, которые сохраняются всеми операциями из M .

Пусть на множестве $\{1, \dots, n\}$ задано отношение эквивалентности. Предикат ρ называют *диагональю*, если $\rho(a_1, \dots, a_n) = 1$ тогда и только тогда, когда $a_i = a_j$ для всех пар $i, j \in \{1, \dots, n\}$ из одного класса эквивалентности. Для удобства множество диагоналей дополняют пустым предикатом. Тем самым, ρ — диагональ тогда и только тогда, когда $\text{Pol}(\{\rho\}) = P_k$.

Предикатом равенства называют такую диагональ $\rho_=$ арности 2, что $\rho_=(x, y) = 1 \Leftrightarrow x = y$.

Предикаты могут выводиться из других предикатов аналогично операциям суперпозиции над функциями. Говорят, что предикат ρ *выводится из множества предикатов* $\{\rho_\alpha\}_{\alpha \in A}$, если он представим в виде

$$\rho(x_1, \dots, x_n) = \exists y_1 \dots \exists y_l (\rho_{i_1}(z_{1,1}, \dots, z_{1,n_1}) \wedge \dots \wedge \rho_{i_s}(z_{s,1}, \dots, z_{s,n_s})),$$

где $z_{i,j} \in \{x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_l\}$ и $\rho_{i_j} \in \{\rho_\alpha\}_{\alpha \in A} \cup \{\rho_=\}$. При этом $\text{Pol}(\{\rho\}) \supset \text{Pol}(\{\rho_\alpha\}_{\alpha \in A})$.

Предикат называют *существенным*, если он не выводится без кванторов существования из множества всех предикатов меньшей арности.

Через \tilde{R} обозначают множество всех существенных предикатов.

Замечание. $d_{(E_k, M)}(n) = d_{(E_k, M \cap \tilde{R})}(n)$.

Предикат ρ называют *важным*, если $\rho(a, \dots, a) = 1$ для любого $a \in E_k$ и при этом предикат ρ не является диагональю, то есть $\text{Pol}(\{\rho\}) \neq P_k$.

Термин важного предиката впервые был введён в [5] для доказательства следующего утверждения:

Теорема. $d_{(E_k, M)}(n) - \log_k n = O(1)$ при $n \rightarrow \infty$ тогда и только тогда, когда не найдётся важного предиката $\rho \in \text{Inv}(M)$. Причём, если не нашлось важного предиката $\rho \in \text{Inv}(M)$, то $|d_{(E_k, M)}(n) - \log_k n| \leq k + 1$ для любого n .

Через \mathcal{R}_{Imp} обозначают множество всех важных предикатов.

В настоящей работе получены следующие результаты:

Теорема 1. Пусть $|\text{Inv}(M) \cap \tilde{R} \cap \mathcal{R}_{\text{Imp}}| < \infty$. Тогда $d_{(E_k, M)}(n) \asymp \log n$, $n \rightarrow \infty$.

Следствие 1. Пусть $|\text{Inv}(M) \cap \tilde{R}| < \infty$. Тогда $d_{(E_k, M)}(n) \asymp \log n$, $n \rightarrow \infty$.

Список литературы

- [1] Chen H., “Quantified constraint satisfaction and the polynomially generated powers property”, International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 2008, 197–208.
- [2] Боднарчук В. Г., Калужнин Л. А., Котов В. Н., Ромов Б. А., “Теория Галуа для алгебр Поста I”, *Кибернетика*, 1969, №3, 1–10.
- [3] Боднарчук В. Г., Калужнин Л. А., Котов В. Н., Ромов Б. А., “Теория Галуа для алгебр Поста II”, *Кибернетика*, 1969, №5, 1–9.
- [4] Lau D., *Function Algebras on Finite Sets*, Springer Science & Business Media, Berlin, Heidelberg, 2006, 668 с.
- [5] Комков С. А., “Мощности генерирующих множеств по операциям из классов решетки Поста”, *Дискрет. матем.*, **30**:1 (2018), 19–38; *Discrete Math. Appl.*, **29**:3 (2019), 159–173.

On growth rate of structures with a finite number of essential constraints

Komkov S.A.

Growth rate is a function defined for an arbitrary finite set A with a set of operations M defined on it. Its order characterizes the strength of given operations. We show that if there is only a finite number of important essential predicates among all predicates that are preserved by each function from M then the growth rate order of the (A, M) pair is logarithmic.

Keywords: growth rate, finite sets, constraint language, logarithmic growth rate.

References

- [1] Chen H., “Quantified constraint satisfaction and the polynomially generated powers property”, International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 2008, 197–208.
- [2] Bodnarchuk V. G., Kaluzhnin L. A., Kotov V. N., Romov B. A., “Galois theory for post algebras. I”, *Cybernetics*, **5**:3 (1969), 243–252.
- [3] Bodnarchuk V. G., Kaluzhnin L. A., Kotov V. N., Romov B. A., “Galois theory for Post algebras. II”, *Cybernetics*, **5**:5 (1969), 531–539.
- [4] Lau D., *Function Algebras on Finite Sets*, Springer Science & Business Media, Berlin, Heidelberg, 2006, 668 с.
- [5] Komkov S. A., “On classes of functions of many-valued logic with minimal logarithmic growth rate”, *Discrete Mathematics and Applications*, **30**:4 (2020), 265–272.